

ГЕПАДИФ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ.

Т.В. Бойко, Г.В. Лихацька

ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.
Горбачевського МОЗ України”.

В сучасній гастроентерології проблема хронічних дифузних захворювань печінки є однією з найбільш важливих. За останні 10 років в Україні збільшився рівень смертності за цими захворюваннями більше ніж на 76%. Цироз печінки (ЦП) є надзвичайно актуальним питанням сьогодення і посідає перше місце серед причин смертності від хвороб органів травлення.

Мета дослідження - вивчити вплив гепадифу на динаміку клініко-лабораторних показників у хворих на цироз печінки (ЦП).

Матеріали і методи дослідження. Обстежено 25 хворих на ЦП алкогольної етіології в стадії субкомпенсації, серед них було 15 (60,0%) чоловіків та 10 (40,0%) жінок, віком від 25 до 75 років. Пацієнти були поділені на дві групи: 1-ша (15 хворих) отримувала стандартне комплексне лікування (контрольна група): есенціальні фосфоліпіди, сечогінні, вітаміни, лактулозу, дезінтоксикаційні засоби; 2-га (10 хворих) додатково приймала гепадиф по 5,0 на глюкозі 5%–200,0 внутрішньовенно краплинно 5 днів, а потім по 1табл. (300 мг) 3 рази на добу до одного місяця. Діагноз верифікували на основі клініко-лабораторних та інструментальних досліджень. Функціональний стан печінки оцінювали за клінічними даними, показниками біохімічного аналізу крові, коагулограми.

Результати дослідження та їх обговорення. Встановлено, що у хворих 2-ої групи відмічалась більш швидка ліквідація клінічних проявів патологічного процесу: зникли больовий синдром, диспепсичний залишився у 15,5 %, астено-вегетативний у 20,4 % обстежених; у хворих 1-ої групи відповідно 16,5 %; 24,3 %; 28.5 %. Виявлено, що у 2-ій групі хворих після лікування

достовірно знижувався рівень білірубіну ($p < 0,05$), трансаміназ ($p < 0,05$), тоді як у 1-ій групі мала місце лише тенденція до зменшення ($p > 0,05$).

Висновки:

1. Комплексне лікування цирозу печінки з включенням гепадифу приводить до кращої динаміки основних клінічних синдромів.
2. Включення гепадифу в комплексну терапію приводить до нормалізації біохімічних показників крові (білірубіну, трансаміназ).

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні впливу гепадифу на перебіг хронічних гепатитів різної етіології.

АВТОРСЬКА ДОВІДКА

Тільки публікація

Бойко Тетяна Василівна

к. мед. н.

Доцент кафедри внутрішньої медицини № 3

ТДМУ м. Тернопіль

Вул. 15 квітня 10 кв.1, 26-84-26.

.