

УДК 616.61-092: 546.62

РОЛЬ КСЕНОБІОТИКІВ НА ЗМІНИ ІОНРЕГУЛОВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ НИРОК У СТЕТЕВОЗРІЛИХ ТВАРИН

Ю.М. Вепрюк

Вищий державний навчальний заклад України
«Буковинський державний медичний університет»

E-mail: biology@bsmu.edu.ua

Солі свинцю та алюмінію володіють нефротоксичною дією за рахунок здатності даних важких металів викликати блокаду – SH груп ферментів енергетичного обміну таких як сукцинатдегідрогеназа, транспортного ферменту – $\text{Na}^+ - \text{K}^+$ - АТФ – ази, білка аквапорину 1, що призводить до порушення реабсорбції іонів натрію і води в проксимальному відділі нефрону і призводить до розвитку гострої ниркової недостатності.

Аналіз показників іонорегулюваної функції нирок в інтактних статевозрілих щурів при уведенні солей свинцю та алюмінію показав, що концентрація іонів натрію в сечі та його екскреція зростали відповідно на 62% ($p<0,001$) та на 20%. Фільтраційна фракція іонів натрію за умов уведення солей алюмінію та свинцю в статевозрілих щурів знижувалася на 42% ($p<0,05$). Виявлений факт, що тенденція до росту відмічалася для екскреції іонів натрію, стандартизованої за швидкістю клубочкового фільтрата, вказує на деякий нефротоксичний вплив на проксимальний відділ нефrona. Відносна реабсорбція іонів натрію зазнавала тенденції до гальмування, зростав концентраційний індекс іонів натрію на 60% ($p<0,001$). Водночас виявлені факти, що дистальна і проксимальна реабсорбції іонів натрію, стандартизовані за швидкістю клубочкової фільтрації, змін не зазнавали та вказують на деякий протекторний вплив солей алюмінію щодо зменшення нефротоксичного впливу солей важкого металу свинцю.

Таким чином, зміни даної функції нирок вказують на активацію механізму тубуло-гломерулярного зворотного зв'язку та на ушкодження проксимального каналця нефрону за умов досліду.