

СТАН ЗАХВОРЮВАНOSTІ НА РОТАВІРУСНУ ІНФЕКЦІЮ

В М. ТЕРНОПОЛІ ЗА 2012-2016 р.р.

М.М. Павельєва, А.О. Поліщук, Б.Є. Козяр, І.І. Лесів, Л.В. Гранична,

О.К. Гаврон, О. А. Олійник, І.С.Іщук

ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України»

ДУ «Тернопільський міський відділ ОЛЦМОЗ України»,

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет

імені І.Я. Горбачевського»

Інфікування ротавірусами відбувається фекально-оральним шляхом, хоча деякі науковці не відкидають повітряно-крапельний механізм передачі. Аналізуючи динаміку захворюваності ротавірусною інфекцією за 2012-2016 р.р., відмічається тенденція до її росту. Так, інтенсивний показник захворюваності на 100 тис. населення коливається від найнижчого у 2012 р.- 7,37 до найвищого у 2015 р.- 36,6 випадків на 100 тис. населення. У зв'язку із реєстрацією спалаху рота вірусної інфекції у двох садочках інтенсивний показник на 100 тис. населення м. Тернополя у 2015 р. перевищив середній по Україні. Внаслідок цього постраждала 21 особа. Поширенню захворювання сприяло недотримання правил особистої гігієни.

Ротавірусна інфекція реєструється протягом усього року і має виражену сезонність з підйомом захворюваності в зимово-весняний період з піком у січні. Спорадичні випадки захворювання спостерігаються у літні місяці.

У віковій структурі захворюваності найбільш вразливими виявились діти віком 1-4 р. - 61 %. Частка дітей до 1 р. склала 14 %, 5-9р.- 6 %, 10-14 р.- 1 %, доросле населення - 18 %. У середньому за 2012-2016 р.р. частка ротавірусних гастроентероколітів серед усіх ГЕК встановленої етіології становила 31,8 %. Варто зазначити, що захворюваність на ротавірусну інфекцію є значно вищою від наведених показників за рахунок недостатній ненастороженості лікарів щодо можливого вірусного походження захворювання, а не лише обстеження пацієнтів на виявлення бактеріального збудника.