

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПСИХООРГАНІЧНОГО СИНДРОМУ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-ГО ТИПУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТУПЕНЯ ВАЖКОСТІ

Ткаченко О.В., Лежнюк А.С.

Запорізька медична академія післядипломної освіти МЗ України

Актуальність. Порухення когнітивних функцій у хворих на цукровий діабет (ЦД) 2-го типу може досягати рівня деменції. В свою чергу ці порушення можуть виступати ампліфікуючими факторами та факторами екзацерації інших психічних феноменів, а також підвищують рівень смертності, що обумовлює необхідність подальшого їх вивчення.

Мета роботи. Встановити особливості психоорганічного синдрому у хворих на ЦД 2-го типу в залежності від ступеню важкості.

Матеріали та методи дослідження. На базі КЗ «Запорізька міська клінічна лікарня № 10» та КУ «Обласний клінічний ендокринологічний диспансер Запорізької обласної ради» було проведено обстеження 543 хворих на ЦД 2-го типу, які були поділені на 3 клінічні групи: КГ- 1 – 57 хворих з легким ступенем тяжкості ЦД; КГ-2 — 312 хворих з середнім ступенем тяжкості. КГ-3 – 174 хворих з важким ступенем тяжкості. Методи дослідження: клініко-анамнестичний, клініко-психопатологічний, психодіагностичний, статистичний.

Результати дослідження та їх обговорення. В КГ-1 та КГ-2 достовірно переважали легкі когнітивні порушення, тоді як у КГ-3 частота зустрічаємості легких когнітивних порушень і деменції легкого ступеня вираженості була однаковою, на тлі достовірного превалювання над частотою зустрічаємості деменції помірного ступеня вираженості. Однак, крім істиного психоорганічного синдрому були відзначені псевдокогнітивні – феномени, що входять в структуру інших психопатологічних синдромів.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Встановлена частота, залежність між ступенем важкості і рівнем вираженості психоорганічного синдрому, а також порушення у інших психічних сферах для яких психоорганічний синдром, виступав в якості ампліфікуючого фактора.