

# СУЧАСНІ ПІДХОДИ У ЛІКУВАННІ ДИСПЛАЗІЙ ШИЙКИ МАТКИ НА ФОНІ ПАПІЛОМАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ

Маланчук С.Л., Маланчук Л.М., Доброродня Л.В., Мартинюк В.М.

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет  
імені І.Я. Горбачевського» МОЗ України

Вступ. Рак шийки матки в структурі онкогінекологічної патології займає друге місце. Особливу увагу привертають запущені форми, які асоціюються не лише зі зміною якості життя жінки і втратою репродуктивного здоров'я, але й високою летальністю в цій групі. Тому, своєчасна діагностика доброякісних захворювань та передпухлинної патології шийки матки, дозволить зменшити негативні наслідки онкологічних захворювань жіночих статевих органів.

Метою нашого дослідження було вивчення ефективності використання противірусного препарату на основі флавоноїдних глікозидів у формі вагінальних супозиторіїв та розчину у жінок з дисплазією шийки матки (CIN-I, CIN-II).

Під спостереженням знаходилося 60 жінок віком від 21 до 35 років з дисплазією шийки матки на фоні папіломавірусної інфекції людини (ВПЛ - 16, 18-онкотипи). Обстежені були розподілені на дві групи.

Пацієнткам I групи призначався перорально препарат «Протефлазід» в схемі рекомендованій виробником та місцево вводився препарат «Протефлазід» у вигляді вагінальних супозиторіїв впродовж 14 днів двічі на добу, циклічно 3 менструальні цикли. У II групі дослідження призначалася пероральна форма «Протефлазиду» та тампони у вагіну з розчином цього препарату (3 мл розводили у 20 мл фізрозчину; час експозиції – 30 хв) двічі на добу впродовж 14 днів.

Висновки. Результати проведеного клінічного дослідження підтвердили високу ефективність, безпечність та зручність використання противірусного препарату «Протефлазід» у формі крапель та вагінальних супозиторіїв при лікуванні дисплазій шийки матки на фоні ВПЛ.