

**РЕЗУЛЬТАТИ ІНДЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ТКАНИН
ПАРОДОНТА У ОСІБ ІЗ ПЕРВИННИМ ГІПОТИРЕОЗОМ ПРИ
ЗАСТОСУВАННІ КОМБІНОВАНОЇ ФАРМАКОТЕРАПІЇ**

А.В. Чорній, В.В. Шманько

ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.

Горбачевського МОЗ України”

Вступ. Комплексне лікування генералізованого пародонтиту у пацієнтів із первинним гіпотиреозом повинно включати заходи спрямовані на ліквідацію запального процесу, стабілізацію стану тканин пародонта, корекцію порушень імунних та обмінних процесів організму.

Мета дослідження: вивчити вплив комбінованої фармакоterapiї захворювань пародонта у осіб із первинним гіпотиреозом .

Матеріали та методи дослідження. Запропонованим нами методом було проведено лікування захворювань пародонта у 30 хворих на первинний гіпотиреоз. Фармакоtherапевтичний комплекс для місцевого лікування включав антисептик холісал гель та перорально цитопротектор імуновел. Індексна оцінка включала визначення індексів: гігієни порожнини рота Грина-Вермільйона, ступеня запалення ясен за (РМА), потребу лікування за (КПІ).

Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз отриманих результатів показав позитивний вплив комбінованої фармакоtherапії захворювань пародонта у осіб із первинним гіпотиреозом. Так, індекс гігієни знизився на 50,5 % і відповідав задовільному стану гігієни порожнини рота ($p < 0,05$), індекс РМА на 61,4 % ($p < 0,05$), а індекс КПІ на 42,3 % ($p < 0,05$) відповідно, що вказує на наявність легкого ступеня важкості гінгівіту у таких пацієнтів.

Висновок. Таким чином, місцеве застосування антисептика холісал гель та пероральне - цитопротектора імуновел сприяє покращенню стану тканин пародонта у осіб із первинним гіпотиреозом, що позитивно відображається на клінічні картині захворювання.