

УДК: 616.36+616.411]-002.3-089

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ АБСЦЕСІВ ПАРЕНХІМАТОЗНИХ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ

Клішин О.А.

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», кафедра хірургії
№2

Мета - провести аналіз хірургічних методик лікування хворих з абсцесами паренхіматозних органів черевної порожнини на основі ретроспективних даних.

Матеріали та методи. У період з 2006 по перший квартал 2017 року на базі клініки хірургії обласної лікарні ім. І.І. Мечникова лікувалися 202 пацієнта з абсцесами паренхіматозних органів черевної порожнини. Всіх пацієнтів ми розділили на 2 групи. Перша з абсцесами печінки, друга з абсцесами селезінки.

Результати та їх обговорення. За звітний період виявлено 183 пацієнта з абсцесами печінки і 19 випадків з абсцесами селезінки. Тільки консервативне лікування отримували 15 (8,2 %) осіб з абсцесами печінки і 1 (5,3 %) осіб з абсцесом селезінки. Пункційні метод під УЗ-контролем без подальшого дренивання застосовувався у 9-ти (4,9 %) хворих з абсцесами печінки і у 1 (5,3 %) хворого з абсцесом селезінки. Пункційні метод під УЗ-контролем з наступним дрениванням застосовувався у 146 (79,8 %) хворих з абсцесами печінки і у 9 (47,4 %) хворих з абсцесами селезінки. У 2-ух випадках (1,1 %) абсцес з правої частки печінки переходив на передню черевну стінку з формуванням флегмони передньої черевної стінки, що вимагало розкриття флегмони і дренивання порожнини абсцесу. Лапароскопія виконувалася у 4 (2,2%) хворих з абсцесами печінки. У 10 (5,5%) випадках хворим з абсцесами печінки виконувалася лапаротомія в поєднанні з іншими втручаннями, 2 (1,1%) з яких - резекції печінки з приводу множинних абсцесів.

Висновки. Успішне використання сучасних методів хірургічного лікування абсцесів паренхіматозних органів черевної порожнини з використанням мінінвазивних і лапароскопічних методик дозволяє домогтися гарних результатів лікування.